

レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP (分割) /RT

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1 管	

レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP (分割) /RT

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 130002  
 レジメン名称 CDDP (分割) /RT  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP (分割) /RT

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP (分割) /RT

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP (分割) /RT

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 130002  
 レジメン名称 CDDP (分割) /RT  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 4 日目

ページ数：7/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP (分割) /RT

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		



レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP（分割）/RT

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：9/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP（分割）/RT

投与間隔 21 日

備考

病日 6 日目

ページ数：10/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード130002

レジメン名称 CDDP (分割) /RT

投与間隔 21 日

備考

病日 7 日目

ページ数：11/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	