

レジメンコード 130005
 レジメン名称 CBDCA/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トローワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 130005
 レジメン名称 CBDCA/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の①終了後、ルート交換 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 130005
 レジメン名称 CBDCA/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 130005
 レジメン名称 CBDCA/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 130005
 レジメン名称 CBDCA/5-FU
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
— 以下余白 —		