

レジメンコード 130008
 レジメン名称 DOC (25mg/m²)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注20mg/1mL 「EE」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 130008
 レジメン名称 DOC (25mg/m²)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注20mg/1mL 「EE」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 130008
 レジメン名称 DOC (25mg/m²)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注20mg/1mL 「EE」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		