

レジメンコード 130014
 レジメン名称 5-FU/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① ②と同時に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] アクプラ静注用50mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 130014
 レジメン名称 5-FU/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキソプラチン注射液10mg「オキ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ① ②と同時に投与開始 点滴時間 12時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 12時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 130014
 レジメン名称 5-FU/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オキサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ① ②と同時に投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 1000 m g / m ²	

レジメンコード 130014
 レジメン名称 5-FU/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オキサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ① ②と同時に投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 1000 m g / m ²	
- 以下余白 -		

レジメンコード 130014
 レジメン名称 5-FU/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オキサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ① ②と同時に投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 1000 m g / m ²	
- 以下余白 -		

レジメンコード 130014
 レジメン名称 5-FU/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 6 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オキサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ① ②と同時に投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 3時間 - 以下余白 -	500 m L 1000 m g / m ²	