

レジメンコード 130015
 レジメン名称 DOC/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 0.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) ドセタキセル点滴静注用 80mg/4mL 「EE」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 mL 70 mg / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] アクプラ静注用 50mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 mL 100 mg / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{ハク} プラミド ^{ハク} 注射液 10mg 「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 8時間	500 mL 1 管	
点滴注射 (D I V) アクチット注 [500mL/B] 後) 塩酸 ^{ハク} プラミド ^{ハク} 注射液 10mg 「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 8時間	500 mL 1 管	
— 以下余白 —		