

レジメンコード 130016  
 レジメン名称 DOC/CDDP  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L 1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 15 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) ドセタキセル点滴静注用80mg/4mL 「EE」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 130016  
 レジメン名称 DOC/CDDP  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L 1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 15 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 130016  
 レジメン名称 DOC/CDDP  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L 1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 15 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 130016  
 レジメン名称 DOC/CDDP  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L 1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 15 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 130016  
 レジメン名称 DOC/CDDP  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L 1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 15 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	