

レジメンコード130024

レジメン名称 PAC/Cmab (400) (導入)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] アービタックス注射液100mg [20mL/B] ■Cmab投与終了後60分は経過観察■ ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分	50 m L	

レジメンコード 130024

レジメン名称 PAC/Cmab (400) (導入)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ハパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「ホーカ」10mL ○化学療法で実施 ⑧ — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード 130024
 レジメン名称 PAC/Cmab (400) (導入)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] アービタックス注射液100mg [20mL/B] ■Cmab投与終了後60分は経過観察■ ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分	50 m L	

レジメンコード130024

レジメン名称 PAC/Cmab (400) (導入)

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ハパリンNa ¹⁰ 用10単位/mLシリンジ「ホツカ」10mL ○化学療法で実施 ⑧ — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード 130024
 レジメン名称 PAC/Cmab (400) (導入)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] アービタックス注射液100mg [20mL/B] ■Cmab投与終了後60分は経過観察■ ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分	50 m L	

レジメンコード130024

レジメン名称 PAC/Cmab (400) (導入)

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) へ ^o リンNa ^o ック用10単位/mLシリンジ「オ ^o ツカ」10mL ○化学療法で実施 ⑧ — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード 130024
 レジメン名称 PAC/Cmab (400) (導入)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 22 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] アービタックス注射液100mg [20mL/B] ■Cmab投与終了後60分は経過観察■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ヴァリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL ○化学療法で実施 ④ — 以下余白 —	1 筒	