

レジメンコード130029

レジメン名称 wPAC（甲状腺未分化癌）

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピター」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）ハリンNa [®] パック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL ○化学療法で実施 ⑤ — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード130029

レジメン名称 wPAC（甲状腺未分化癌）

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）ハリンNa [®] パック用10単位/mLシリンジ「ホツカ」10mL ○化学療法で実施 ⑤ — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード130029

レジメン名称 wPAC（甲状腺未分化癌）

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピター」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）ハリンNa [®] パック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL ○化学療法で実施 ⑤ — 以下余白 —	1 筒	